

## Сейчас сезон гриппа и простуды. Важно ли в этот период вакцинироваться?

Важно, так как у лиц из групп риска грипп и коронавирус могут вызвать серьезные осложнения. Между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее 30 дней



## От чего в первую очередь нужно вакцинироваться — от коронавируса или гриппа?

С учетом эпидситуации, если человек не болел коронавирусом или не вакцинировался от него, то сначала нужно привиться от COVID-19. Спустя 30 дней после полного цикла вакцинации можно ставить прививку от гриппа



## Какую прививку нужно поставить? С какого возраста ее можно ставить?

Есть вакцины от гриппа, разрешенные к применению с 6 месяцев, также они не противопоказаны во время беременности. «Спутник Лайт» — для тех, кто переболел COVID-19 или уже привит от него. У «Гам-КОВИД-Вак» нет противопоказаний для беременных. Все вакцины от коронавируса разрешены к применению лицам старше 18 лет



## **Вакцина от гриппа бесплатная? Куда за ней обратиться?**

Бесплатная, как и от коронавируса инфекции. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства. Также многие работодатели организуют вакцинацию сотрудников на рабочих местах



**Если вакцинировался от COVID-19 давно и пришло время ревакцинации, то как это совместить с прививкой от гриппа?**

Сначала поставить прививку от гриппа, а через 30 дней ревакцинироваться от коронавируса



## Какое обследование нужно пройти перед вакцинацией?

Здоровому человеку специальное лабораторное обследование проходить не нужно. Лица с хроническими заболеваниями и старшего возраста проходят обследования у лечащих врачей. Например, если у пациента сахарный диабет, то именно эндокринолог дает заключение и рекомендации по вакцинации

